

TADALAFIL (Adcirca[®], Cialis[®])

Quelle est l'utilisation du tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®])?

Le tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). L'HTAP est définie par une pression artérielle élevée dans les poumons due au fait que les artères pulmonaires, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les poumons, se sont rétrécies ou cicatrisées.

Comment le médicament agit-il?

Le tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) est un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 (PDE-5) qui abaisse la tension artérielle dans les poumons, ce qui permet au cœur de pomper le sang plus efficacement. Le tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) empêche les enzymes PDE 5 de dégrader l'oxyde nitrique dans les artères pulmonaires, ce qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. La prise de ce médicament peut améliorer votre capacité à faire de l'exercice et ralentir la progression de votre maladie.

Que dois-je savoir?

Contre-indications :

Ne prenez pas de tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) si :

- Vous avez déjà fait une réaction allergique au tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) ou à l'un de ses ingrédients
- Vous avez déjà présenté une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIA-NA)
- Vous prenez des médicaments contenant des nitrates, peu importe la forme (orale, vaporisation, sublinguale, onguent et/ou timbre transdermique)
- Vous prenez du riociguat (Adempas[®])

Il faut éviter de prendre du tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) dans les cas de maladie hépatique (du foie) grave.

Information importante :

Évitez le jus de pamplemousse.

Si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de le devenir, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale.

Interactions médicamenteuses

Les médicaments suivants peuvent interagir avec le tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]). Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des interactions médicamenteuses.

Veuillez parler avec votre équipe médicale avant de commencer à prendre tout nouveau médicament.

L'utilisation du tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]) avec des médicaments pour traiter la tension artérielle peut causer une hypotension (tension artérielle basse) chez certains patients.

Les médicaments utilisés pour le traitement des infections fongiques — p. ex., kétoconazole (Apo-Ketoconazole[®]), itraconazole (Sporanox[®]) et voriconazole (Vfend[®])

Les nitrates, peu importe la forme — p. ex., nitroglycérine en vaporisateur, en comprimés, en onguent, ou en timbre transdermique, dinitrate ou mononitrate d'isosorbide

Les médicaments utilisés pour traiter une infection à VIH — p. ex., darunavir (Prezista[®]), ritonavir (Norvir[®]), nelfinavir (Viracept[®]) et saquinavir (Invirase[®])

Les antibiotiques — p. ex., érythromycine (Eryc[®]), clarithromycine (Biaxin[®]), télichromycine (Ketek[®]) et rifampine (Rofact[®])

Les médicaments utilisés pour les troubles convulsifs — p. ex., phénytoïne (Dilantin[®]) et carbamazépine (Tegretol[®])

Les médicaments utilisés pour traiter l'hypertension pulmonaire et/ou la dysfonction érectile — p. ex., riociguat (Adempas[®]), sildénafil (Revatio[®], Viagra[®]) et vardénafil (Levitra[®])

Remarque:

Veuillez mentionner à votre équipe médicale TOUS les médicaments que vous prenez, incluant les médicaments en vente libre, les vitamines, les minéraux, les suppléments et produits de santé naturels et les produits de médecine douce.

TADALAFIL (Adcirca[®], Cialis[®])

Comment dois-je prendre le tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®])?

Prenez deux comprimés, une fois par jour, avec ou sans nourriture.

Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre une dose de tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]), prenez le comprimé dès que vous constatez cet oubli. Ne prenez pas deux doses en même temps. Si le moment est presque venu de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée; prenez simplement la dose suivante à l'heure prévue.

Quels sont les effets secondaires fréquents?

Certains patients peuvent présenter des effets secondaires quand ils prennent ce médicament. Si les effets secondaires sont graves ou inconfortables, veuillez communiquer avec votre équipe médicale. Les effets secondaires peuvent comprendre :

- Mal de tête
- Bouffées vasomotrices (rougissement accompagné d'une sensation de chaleur)
- Douleurs musculaires
- Congestion nasale
- Indigestion et brûlures d'estomac
- Vision embrouillée ou perturbée
- Perte soudaine de vision ou d'audition



Dans quelles circonstances devrais-je communiquer avec ma clinique d'HTP ou consulter un médecin?

Communiquez immédiatement avec votre équipe médicale ou consultez un médecin si vous présentez :

- Des symptômes d'une aggravation de l'HTP, incluant : une difficulté à respirer, une rétention de liquides ou une prise de poids et/ou des étourdissements ou une perte de conscience
- Une perte soudaine de vision ou d'audition
- Une érection douloureuse ou prolongée
- Une réaction allergique, incluant : une enflure au niveau de la bouche, de la langue, du visage ou de la gorge, des démangeaisons, une éruption cutanée et/ou de la difficulté à respirer

Si vous prenez une dose supérieure à la dose qui vous a été prescrite, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale même si vous vous sentez bien.

N'arrêtez pas de prendre le tadalafil (Adcirca[®], Cialis[®]), à moins d'un avis contraire de la part de votre équipe médicale.

Renseignements additionnels :

Conservez le médicament hors de la portée des enfants à 15°–30° C.

N'utilisez pas de médicaments périmés.

Ne jetez aucun médicament dans un évier ou une toilette, ni dans les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de quelle façon vous devez éliminer vos médicaments si vous n'en n'avez plus besoin.

Pour plus d'information, veuillez consulter la monographie complète du produit.

Pour en apprendre davantage sur l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et sur les traitements disponibles, veuillez visiter le www.ahtpcanada.ca/en-savoir-plus.

Cette ressource éducative a été élaborée par le Réseau des professionnels de la santé traitant l'HTP, un réseau de l'AHTP Canada qui réunit des infirmières du domaine de l'HTP provenant de partout au pays en vue d'améliorer les soins infirmiers dans ce domaine, et ce, en favorisant le leadership, l'éducation et le perfectionnement professionnel.

Les renseignements fournis dans la présente ressource sont destinés à des fins éducatives seulement. Veuillez communiquer avec votre équipe médicale pour établir un plan de traitement personnalisé et pour discuter de tout changement à votre mode de vie ou à votre plan de traitement.