

SOTATERCEPT (Winrevair®)

Quelle est l'utilisation du sotatercept (Winrevair)?

Le sotatercept (Winrevair) est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter l'**hypertension artérielle pulmonaire** (HTAP). L'HTAP est définie par une pression artérielle élevée dans les poumons due au fait que les artères pulmonaires, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les poumons, se sont rétrécies ou cicatrisées.

Comment le médicament agit-il?

Sotatercept (Winrevair) est un **inhibiteur de la signalisation de l'activine**. Chez les patients atteints d'HTAP, la voie des activines devient prédominante et stimule la croissance cellulaire anormale dans les artères pulmonaires. Sotatercept se lie aux activines et inhibe la prolifération cellulaire anormale dans les artères pulmonaires.

La prise de ce médicament peut ralentir la progression de l'hypertension artérielle pulmonaire et peut améliorer votre capacité à faire de l'exercice.

Que dois-je savoir?

Ne prenez pas de sotatercept (Winrevair) si :

- Vous êtes allergique au sotatercept (Winrevair) ou à l'un de ses ingrédients
- Votre numération plaquetttaire est inférieure à $50.0 \times 10^9/L$
- Vous présentez un saignement grave.

Le sotatercept peut nuire à la fertilité féminine et masculine. **Si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de le devenir, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale.**

Comment dois-je prendre le sotatercept (Winrevair)?

Le sotatercept (Winrevair) est administré par injection sous-cutanée une fois toutes les trois semaines. La posologie dépend de votre poids corporel.

La dose initiale habituelle est de 0,3 mg/kg, puis augmente progressivement jusqu'à une dose maximale de 0,7 mg/kg.

Si vous prenez une dose différente de celle qui vous a été prescrite, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale même si vous vous sentez bien.

N'arrêtez pas de prendre le sotatercept (Winrevair) à moins d'un avis contraire de la part de votre équipe médicale.

Quels sont les effets secondaires fréquents?

Certains patients peuvent présenter des effets secondaires quand ils prennent ce médicament. Si les effets secondaires sont graves ou incommodants, veuillez communiquer avec votre équipe médicale. Les effets secondaires courants peuvent comprendre :

- Épistaxis ou des gencives saignantes
- Télangiectasie (grappes rouges de petits vaisseaux sanguins sur la peau)
- Mal de tête
- Diarrhée
- Une éruption cutanée
- Bouffées congestives
- Faible numération plaquetttaire (thrombocytopénie)
- Augmentation de la pression artérielle
- Augmentation du taux hémoglobine

Dans quelles circonstances devrais-je communiquer avec ma clinique d'HTP ou consulter un médecin?

Communiquez immédiatement avec votre équipe médicale ou consultez un médecin si vous présentez :

Effets secondaires graves:

- Épistaxis ou autres saignements durant plus de 10 minutes
- La vomissure sanguine ou noir
- Des selles noires ou goudronneuses
- Des selles sanguinolentes

SOTATERCEPT (Winrevair®)

Des symptômes d'une aggravation de l'HTAP :

- Une difficulté à respirer
- Une rétention de liquides ou une prise de poids
- Des étourdissements ou une perte de conscience.

Une réaction allergique :

- Une enflure au niveau de la bouche, de la langue, du visage ou de la gorge
- Des démangeaisons
- Une éruption cutanée
- Une difficulté à respirer.

Dose oubliée

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que possible. Si vous ne la prenez pas dans les 3 jours suivant la date prévue, ajustez votre programme de dosage futur afin de maintenir un intervalle de 3 semaines.

Interactions médicamenteuses

Les interactions du sotatercept avec d'autres médicaments, aliments, produits à base de plantes ou tests de laboratoire n'ont pas encore été déterminées.

Veuillez mentionner à votre équipe médicale tous les médicaments que vous prenez, incluant les médicaments en vente libre, les vitamines, les minéraux, les suppléments et produits de santé naturels et les produits de médecine douce.

Veuillez parler avec votre équipe médicale avant de commencer à prendre tout nouveau médicament.

Renseignements additionnels

- Conservez le médicament hors de la portée des enfants.
- Conservez les flacons au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C dans leur emballage d'origine afin de les protéger de la lumière.
- Le sotatercept doit être limpide. S'il est opaque ou coloré, il ne doit pas être utilisé.
- Ne pas congeler.
- N'utilisez pas de médicaments périmés.
- Demandez à votre pharmacien de quelle façon vous devez éliminer vos médicaments si vous n'en avez plus besoin. Ne jetez aucun médicament dans les ordures ménagères ou dans une toilette.

Pour plus d'information, veuillez consulter [la monographie complète du produit](#).

Les renseignements fournis dans la présente ressource sont destinés à des fins éducatives seulement. Veuillez communiquer avec votre équipe médicale pour établir un plan de traitement personnalisé et pour discuter de tout changement à votre mode de vie ou à votre plan de traitement.



L'ASSOCIATION D'HYPERTENSION
PULMONAIRE DU CANADA
PULMONARY HYPERTENSION
ASSOCIATION OF CANADA

Pour en apprendre davantage sur l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), veuillez visiter le www.PHACanada.ca



Cette ressource éducative a été élaborée par le Réseau des professionnels de la santé traitant l'HTP, un réseau de l'AHTP Canada qui réunit des infirmières du domaine de l'HTP provenant de partout au pays en vue d'améliorer les soins infirmiers dans ce domaine, et ce, en favorisant le leadership, l'éducation et le perfectionnement professionnel.