

MACITENTAN (Opsumit®)

Quelle est l'utilisation de macitentan (Opsumit®)?

Le macitentan (Opsumit®) est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter **l'hypertension artérielle pulmonaire** (HTAP). L'HTAP est définie par une pression artérielle élevée dans les poumons due au fait que les artères pulmonaires, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les poumons, se sont rétrécies ou cicatrisées.

Comment le médicament agit-il?

Le macitentan (Opsumit®) est un **antagoniste des récepteurs de l'endothéline** (ARE) qui abaisse la tension artérielle dans les poumons, ce qui permet au cœur de pomper le sang plus efficacement. L'ambrisentan (Volibris®) aide à prévenir le rétrécissement des vaisseaux sanguins en bloquant l'endothéline, une protéine qui cause la vasoconstriction, dans les artères pulmonaires.

La prise de ce médicament peut ralentir la progression de l'HTAP et soulager ses symptômes.

Que dois-je savoir?

Ne prenez pas de macitentan (Opsumit®) si :

- Vous êtes allergique au macitentan (Opsumit®) ou à l'un de ses ingrédients
- Vous allaitez
- Vous avez une maladie grave du foie.

Si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de le devenir, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale. Ce médicament est connu pour causer des anomalies congénitales graves.

Ce médicament peut causer de l'anémie. Des analyses sanguines seront effectuées régulièrement pendant la première année de traitement.

Comment dois-je prendre le macitentan (Opsumit®)?

Prenez un comprimé de 10 mg une fois par jour, avec ou sans nourriture.

Ne pas couper, écraser ni mâcher les comprimés.

Quels sont les effets secondaires fréquents?

Certains patients peuvent présenter des effets secondaires quand ils prennent ce médicament. Si les effets secondaires sont graves ou inconfortables, veuillez communiquer avec votre équipe médicale.

Les effets secondaires peuvent comprendre :

- Mal de tête
- Irritation des voies respiratoires et des voies nasales (congestion nasale)
- Symptômes grippaux
- Rétention de liquides (enflure)
- Infections urinaires.

Interactions médicamenteuses

L'amiodarone augmente la concentration de macitentan (Opsumit®). De nombreux patients sous macitentan doivent également prendre de l'amiodarone.

Les médicaments suivants peuvent interagir avec le macitentan (Opsumit®):

- **Les antibiotiques**, p. ex. rifampine (Rofact®)
- **Les médicaments utilisés pour traiter des infections fongiques**, p. ex. ketoconazole (Apo-Ketoconazole®) and voriconazole (Vfend®)
- **Les médicaments utilisés pour traiter une infection à VIH**, p. ex. darunavir (Prezista®), ritonavir (Norvir®), nelfinavir (Viracept®)
- **Les médicaments utilisés pour les troubles convulsifs**, p. ex. phénytoïne (Dilantin®) et carbamazépine (Tegretol®)

Cette liste des interactions médicamenteuses n'est pas exhaustive.

Veuillez mentionner à votre équipe médicale TOUS les médicaments que vous prenez, incluant les médicaments en vente libre, les vitamines, les minéraux, les suppléments et produits de santé naturels et les produits de médecine douce.

Veuillez parler avec votre équipe médicale avant de commencer à prendre tout nouveau médicament.

MACITENTAN (Opsumit®)

Dans quelles circonstances devrais-je communiquer avec ma clinique d'HTP ou consulter un médecin?

Communiquez avec votre équipe médicale ou consultez un médecin immédiatement si vous présentez :

Des symptômes d'une aggravation de l'HTP:

- Une difficulté à respirer
- Une rétention de liquides ou une prise de poids
- Des étourdissements ou une perte de conscience.

Une réaction allergique :

- Une enflure au niveau de la bouche, de la langue, du visage ou de la gorge
- Des démangeaisons
- Une éruption cutanée
- Une difficulté à respirer.

Si vous prenez une dose supérieure à la dose qui vous a été prescrite, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale même si vous vous sentez bien.

Dose oubliée

Si vous oubliez de prendre une dose de macitentan (Opsumit®), prenez le comprimé dès que vous constatez cet oubli.

Ne prenez pas deux doses en même temps.

Si l'heure de votre prochaine prise approche, ne prenez pas la dose oubliée. Prenez simplement la prochaine dose à l'heure prévue.

N'arrêtez pas de prendre le macitentan (Opsumit®) sans l'avis de votre équipe médicale.

Renseignements additionnels

- Conservez le médicament hors de la portée des enfants.
- Conservez à température ambiante (entre 15 °C et 30 °C).
- N'utilisez pas de médicaments périmés.
- Demandez à votre pharmacien de quelle façon vous devez éliminer vos médicaments si vous n'en avez plus besoin. Ne jetez aucun médicament dans les ordures ménagères ou dans une toilette.

Pour plus d'information, veuillez consulter [la monographie complète du produit](#).



Cette ressource éducative a été élaborée par le Réseau des professionnels de la santé traitant l'HTP, un réseau de l'AHTP Canada qui réunit des infirmières du domaine de l'HTP provenant de partout au pays en vue d'améliorer les soins infirmiers dans ce domaine, et ce, en favorisant le leadership, l'éducation et le perfectionnement professionnel.



L'ASSOCIATION D'HYPERTENSION
PULMONAIRE DU CANADA
PULMONARY HYPERTENSION
ASSOCIATION OF CANADA

Pour en apprendre davantage sur l'hypertension artérielle pulmonaire, veuillez visiter le www.phacanada.ca

Les renseignements fournis dans la présente ressource sont destinés à des fins éducatives seulement. Veuillez communiquer avec votre équipe médicale pour établir un plan de traitement personnalisé et pour discuter de tout changement à votre mode de vie ou à votre plan de traitement.